Première journée mondiale de l'amylose

L' Association Internationale de lutte contre l'Amylose, « Amyloidosis Alliance » lance une journée mondiale de sensibilisation dédiée à cette maladie rare qui mobilisera 18 pays dans le monde.

18 PAYS PARTICIPANTS



EUROPE
FRANCE
CITERNE
BONNLINK LINK
IRELAND
PAYS-BAS
ITALIE
ALLEMAGNE
SUISSE
AUTRICHE

AUTRES PAYS
USA
AUSTRALIE
CANADA
MEXIQUE
BELGIQUE
COLOMBIE
BRÉSIL
NOUVELLE-ZÉLANDE
VENEZUELA

LES DIFFÉRENTES FORMES DE LA MALADIE

AMYLOSE AL
Une forme acquise non héréditaire

AMYLOSE HÉRÉDITAIRE

LES FORMES SAUVAGES D'AMYLOSE

UN DÉLAI DE DIAGNOSTIC DE
4 ANS
EN MOYENNE

4 ANS
EN MOYENNE
4 symptômes différents en début de maladie

UNE ERREUR À ÉVITER
Ne pas méconnaître les formes sauvages

UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE
LE PRONOSTIC
Améliore significativement la survie

EN MOYENNE
4 SPÉCIALISTES CONSULTÉS
AVANT LE DIAGNOSTIC

3 à 5 ans
DÉLAI DIAGNOSTIQUE DES FORMES SAUVAGES

10 000 PATIENTS ENVIRON DANS LE MONDE POUR LES FORMES HÉRÉDITAIRES DE LA MALADIE (50% DES CAS D'AMYLOSE)

4 000 NOUVEAUX CAS PAR AN AUX USA (CHIFFRE DES ÉTATS-UNIS POUR LES FORMES AL DE LA MALADIE)

10 NOUVEAUX CAS / AN PAR MILLION D'HABITANTS EN EUROPE ET DANS LE RESTE DU MONDE

NOUVEAUX CAS POUR UN DES HABITANTS TOUS LES ANS

LES CHIFFRES DE LA MALADIE*

LES FORMES SAUVAGES LIÉES AU VIEILLISSEMENT SONT SOUVENT SOUS-DIAGNOSTIQUÉES. LA MALADIE EST LA PLUS FORT TAUX DE SOUS-DIAGNOSTIC

QU'EST-CE QUE L'AMYLOSE ?

L'AMYLOSE PEUT TOUCHER PLUSIEURS ORGANES

- LE COEUR
- LES REINS
- LE SYSTÈME DIGESTIF
- LE FOIE
- LE SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE
- ...

UN ENSEMBLE DE MALADIES TRÈS DIFFÉRENTES

DES CAUSES ET EXPRESSIONS MULTIPLES. L'AMYLOSE PEUT ÊTRE SOIT TRÈS LOCALISÉE SUR UN ORGANE OU TOUCHER PLUSIEURS ORGANES.

UNE MALADIE QUI AFFECTE DES ADULTES DE TOUT ÂGE

Entre **30 et 90** ans
APPARITION DE LA MALADIE OU FONCTION DE LA PERSO

Entre **60 et 75** ans
PIC DE DIAGNOSTIC

2 ORIGINES POSSIBLES À LA MALADIE

01 | FORMES ACQUISES

NON TRANSMISSIBLES

AMYLOSE AL

TRANCHE D'ÂGE
Entre 50 et 65 ans

CAUSE
Dysfonctionnement de la matrice osseuse

ORGANES TOUCHÉS
Cœur, reins, foie, système nerveux périphérique

CHIFFRES CLÉS

4000[1] PATIENTS DIAGNOSTIQUÉS EN 2018

6 à 10 ANS DE SURVIE APRÈS LE DIAGNOSTIC

500 NOUVEAUX CAS/AN

PAYS LES PLUS TOUCHÉS
USA
ITALIE
ALLEMAGNE

SYMPTÔMES
LES PLUS FRÉQUENTS*
En dépendent des organes touchés

- VERTIGES OU ÉVANOUISSEMENT DE POSITION
- ESSOUFFLEMENT
- INSUFFISANCE CARDIAQUE
- TROUBLES DIGESTIFS
- INSUFFISANCE RÉNALE
- FATIGUE
- DIARRHÉES ALTERNÉES AVEC URINES TRÈS PEU VOLUMINEUSES

AMYLOSE AA

TRANCHE D'ÂGE
Entre 30 ans en moyenne (extrêmes 22 à 84 ans)[2]

CAUSE
Secondaire à une inflammation chronique*

ORGANES TOUCHÉS

INCIDENCE

< 10 NOUVEAUX CAS PAR AN PAR MILLION D'HABITANTS

SYMPTÔMES
LES PLUS FRÉQUENTS

- FATIGUE
- PERTE D'APPÉTIT
- ESSOUFFLEMENT
- INSUFFISANCE CARDIAQUE
- OEDÈMES DES JAMBES

AMYLOSE ATTR

TRANCHE D'ÂGE
+ de 60 ans

CAUSE
La cardiomyopathie du ventriculosseint

ORGANES TOUCHÉS
Cœur, appareil auditif, système digestif, système nerveux périphérique*

CHIFFRE CLÉ

LA PRÉVALENCE DES ANTICORPS CARDIAQUES AUGMENTE AVEC L'ÂGE (JOURNAL 2020 ESCHARD)

SYMPTÔMES
LES PLUS FRÉQUENTS

- FATIGUE
- ESSOUFFLEMENT
- INSUFFISANCE CARDIAQUE
- SIGNE CANAL LOMBAIRE ÉTROIT
- SIGNE CANAL CARPIEN

02 | FORMES HÉRÉDITAIRES

AMYLOSE hATTR

TRANCHE D'ÂGE
30 ans pour les formes précoces

CAUSE
Une mutation génétique

ORGANES TOUCHÉS
Le cœur, le système digestif,
le système nerveux périphérique

CHIFFRE CLÉS

10 186[3] DÉTENTEURS DE LA PRÉSENCE MUTATION

SYMPTÔMES
LES PLUS FRÉQUENTS*

- VERTIGES OU ÉVANOUISSEMENT DE POSITION
- ESSOUFFLEMENT
- INSUFFISANCE CARDIAQUE
- PERTE DE POIDS
- DIARRHÉE
- FATIGUE
- PERTE DE SENSIBILITÉ DES EXTRÉMITÉS AU CHOC ET AU FROID

NB: [1] Les symptômes sont variés en fonction de la mutation. [2] Âge médian/âge de la première poussée à la cardiomyopathie. [3] Nombre de détenteurs de la mutation V122I en France. Les symptômes évoqués en fonction de la durée de la maladie.

LES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES

STOPPER la production d'amyloïdes

FAIRE DISPARAÎTRE les dépôts amyloïdes

AMÉLIORER la fonction d'organe

LIMITER les complications à l'atteinte des organes

AUTRES THÉRAPEUTIQUES ADJUVANTES ET SOUTIEN ORGANIQUE ACTIVE

LES ACTEURS DE L'AMYLOSE

Des centres d'expertises dédiés à l'amylose existent dans la majorité des pays et doivent être bien identifiés pour permettre une prise en charge précoce et personnalisée.

La connaissance de l'Amylose doit s'étendre auprès de tous les praticiens afin d'améliorer la suspicion et réduire l'errance et l'erreur de diagnostic.

LE 26 OCTOBRE 2021...

...18 pays se mobilisent pour cette première Journée Mondiale contre l'Amylose afin de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à mieux connaître cette maladie rare et à soutenir la recherche médicale. Pour l'occasion un dispositif de sensibilisation digital baptisé BE THE LINK sera lancé sur les réseaux sociaux et en plug&play. En partageant le lien orange BE THE LINK sur les réseaux sociaux, nous contribuerons tous à faire mieux connaître l'amylose et participerons ainsi à réduire l'errance de diagnostic des malades.

Interviews médecins, patients, aînés d'Amylose, la porte-parole Amyloidosis Alliance sur demande au service presse de la journée mondiale.

Qui est-il ? Où le trouver ? → magali.ingel@amyloidosis.net

AMYLOIDOSIS ALLIANCE
ONE VOICE OF PATIENTS

www.worldamyloidosisday.org

SOURCES
1. Gertz MA, Dispenzieri A, Sher T. Pathophysiology and treatment of cardiac amyloidosis. Nat Rev Cardiol. 2015;12(2):91-102. doi:10.1038/nrcardio.2014.165
2. Gertz MA, Comenzo R, Falk RH, et al. Definition of organ involvement and treatment response in immunoglobulin light chain amyloidosis (AL): a consensus opinion from the 10th International Symposium on Amyloid and Amyloidosis, Tours, France, 22-25 April 2004. Am J Hematol. 2005;79(4):319-328. doi:10.1002/ajh.20381
3. Gertz MA, Dispenzieri A, Sher T. Pathophysiology and treatment of cardiac amyloidosis. Nat Rev Cardiol. 2015;12(2):91-102. doi:10.1038/nrcardio.2014.165
4. Gertz MA, Comenzo R, Falk RH, et al. Definition of organ involvement and treatment response in immunoglobulin light chain amyloidosis (AL): a consensus opinion from the 10th International Symposium on Amyloid and Amyloidosis, Tours, France, 22-25 April 2004. Am J Hematol. 2005;79(4):319-328. doi:10.1002/ajh.20381
5. Gertz MA, Dispenzieri A, Sher T. Pathophysiology and treatment of cardiac amyloidosis. Nat Rev Cardiol. 2015;12(2):91-102. doi:10.1038/nrcardio.2014.165
6. Gertz MA, Comenzo R, Falk RH, et al. Definition of organ involvement and treatment response in immunoglobulin light chain amyloidosis (AL): a consensus opinion from the 10th International Symposium on Amyloid and Amyloidosis, Tours, France, 22-25 April 2004. Am J Hematol. 2005;79(4):319-328. doi:10.1002/ajh.20381

AVRIL 2021

NOS PARTENAIRES